

關於善纖達

皮下注射衛教指南

什麼是善纖達？

主成分為 Liraglutide (6.0 mg/mL)，是一種人體腸泌素 GLP-1 的類似物。

作用機轉

透過與大腦中調節食慾的受體結合，**增加飽足感並降低飢餓感**，**同時減緩胃排空速度**，從而減少能量攝取。



+ 每週一次

固定時間注射，方便追蹤療效

+ 劑量調整

起始0.6mg，逐步調至3mg或更高

+ 雙重效益

血糖控制與體重管理同步改善



正確注射步驟

安全有效的使用指南

1.注射前準備

洗淨雙手，備妥用品，檢查藥劑與期限。

3.執行注射動作

拆蓋裝針，旋轉劑量，平貼皮膚按壓兩聲「喀」。

2.選擇注射部位

選擇腹部、大腿或上臂，輪替部位並消毒風乾。

4.注射後處理

拔出針頭丟棄，**避免搓揉**。忘記注射請依指示補打或跳過。

!!! 重要提醒

禁用於個人或家族有甲狀腺髓質癌 (MTC) 病史者，及多發性內分泌腫瘤綜合症第 2 型 (MEN 2)。常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉，通常在劑量調整期較明顯。**請依醫師指示使用，勿自行調整劑量。**



掃描QR code以獲取更多
產品資訊或觀看注射教學影片。



專業諮詢 有任何疑問，請立即聯繫醫療專業人員或藥廠客服

低血糖監測 特別合併胰島素或磺脲類藥物時需密切監測血糖變化